



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China



GAMES 102在线课程

几何建模与处理基础

刘利刚

中国科学技术大学









中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



GAMES 102在线课程：几何建模与处理基础

NURBS曲面


回顾：曲线曲面的不同形式

	Output: 1D	Output: 2D	Output: 3D
Input: 1D	 Function graph	 Plane curve	 Space curve
Input: 2D		 Plane warp	 Surface
Input: 3D			 Space warp

参数曲面

- 双参数 (u, v)

- 参数曲面
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}$$




基本方法：张量积

每个参数的基函数两两相乘得到二元函数的基函数

	$b_1(u)$	$b_2(u)$	$b_3(u)$	$b_4(u)$
$b_1(v)$	$b_1(v)b_1(u)$	$b_1(v)b_2(u)$	$b_1(v)b_3(u)$	$b_1(v)b_4(u)$
$b_2(v)$	$b_2(v)b_1(u)$	$b_2(v)b_2(u)$	$b_2(v)b_3(u)$	$b_2(v)b_4(u)$
$b_3(v)$	$b_3(v)b_1(u)$	$b_3(v)b_2(u)$	$b_3(v)b_3(u)$	$b_3(v)b_4(u)$
$b_4(v)$	$b_4(v)b_1(u)$	$b_4(v)b_2(u)$	$b_4(v)b_3(u)$	$b_4(v)b_4(u)$


张量积函数



张量积曲面




$$\begin{aligned} f(u, v) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_i(u) b_j(v) \mathbf{p}_{i,j} \\ &= \sum_{i=1}^n b_i(u) \sum_{j=1}^n b_j(v) \mathbf{p}_{i,j} \\ &= \sum_{j=1}^n b_j(v) \sum_{i=1}^n b_i(u) \mathbf{p}_{i,j} \end{aligned}$$

- “曲线的曲线”
- 两个参数的顺序无关



Bezier曲面


$$f(u, v) = \sum_{i=0}^d \sum_{j=0}^d B_i^{(d)}(u) B_j^{(d)}(v) \mathbf{p}_{i,j}$$




张量积曲面的性质

- 类似于曲线情形，性质取决于基函数的性质
 - 先沿一个方向做，然后再沿另一个方向做（方向顺序无关）
- Bezier曲面片具有类似的良好性质
 - 边界插值
 - 凸包
 - 变差缩减
 - 几何作图法
 - ...


de Casteljau作图法




Bezier曲面片之间的拼接连续性



C^1 Continuity



C^1 Continuity




其他曲面的定义完全同

- B样条曲面

- 有理曲面



- NURBS曲面





Trimmed NURBS 曲面

表达带“洞”或非矩形边界的曲面


- 表面上的曲线：使用参数域上的NURBS曲线来定义，然后复合得到表面上的曲线





Curves-on-Surfaces (CONS)



Curves-on-Surfaces (CONS)




Curves-on-Surfaces (CONS)



三角域上的Bezier曲面片

三角域的Bernstein-Bezier曲面片



- 矩形域有时不方便
- 使用三角域来定义曲面片




三角Bezier曲面片

$$F(x) = \sum_{\substack{i+j+k=n \\ i,j,k \geq 0}} \frac{n!}{i!j!k!} \alpha^i \beta^j \gamma^k p_{i,j,k}$$

$$x = \alpha a + \beta b + \gamma c, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1$$




连续性



总结

- 张量积曲面
 - 两个独立方向的“曲线的曲线”
 - 性质大都类同于曲线的性质
 - 表达、公式形式比曲线情形复杂
 - 特殊问题：角点的光滑性
- 张量积体（三参数）
 - Bezier体





中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

谢谢！