荧光检测 RecA Intein 的体外剪接活性及抑制

(GFP 体系)

撰写: 潘妍, 刘嫵, 2012-01-04

补充:

实验准备:

- 菌株: BL21;
- 质粒 DNA: pHGmU, 氨苄抗性;
- 其它: 准备 LB 培养液; 250 mM EDTA pH=7.0 ;
- 钴柱或镍柱: (同样的上样量, 通过柱上复性, Ni 柱得到的蛋白量比 Co 柱多, 但 Co 柱纯化得到蛋白剪接产物的荧光吸收峰更窄)
- 预配制 20 mM 磷酸缓冲液 (pH 7.0): 取 11.54 mL 0.5M Na_2HPO_4 , 8.46 mL 0.5 M NaH_2PO_4 , 定容到 500 mL (参考分子克隆书配制 pH 7.0 的磷酸buffer); 将上述溶液调节为以下三种缓冲液:
 1. Buffer A: 20 mM 磷酸 Buffer pH=7.5, 0.5 M NaCl
 2. Buffer B: Buffer A + 8 M 尿素 pH = 7.0 ~ 7.5
 3. Buffer C: Buffer A + 0.5 M 精氨酸+200 mM 咪唑, pH=7.0

【注意】: 配制 Buffer B 和 Buffer C 时, 因加入尿素和精氨酸, pH 会有所变化, 特别是 0.5 M 的精氨酸和 200 mM 咪唑对 pH 的改变非常大, 故还需用 HCl 调整。(如果缓冲溶液的 pH 不准确, 蛋白无法复性, 后面的抑制实验无法进行)

- 实验中涉及到的 Buffer 的配制, 所有上柱的 Buffer 配制好后都要过半径 0.22 μm 的滤膜。

实验操作:

步骤一: 制备感受态细胞以及甘油菌的冻存

1. 感受态细胞用的是 BL21, 制备方法参照分子克隆手册第? 页。
2. 质粒为 pHGmU, 氨苄抗性。
3. 将质粒转化到感受态细胞中 (参照分子克隆手册第? 页), 制成甘油菌冻存在 -80°C 冰箱中。

步骤二：GFP-intein 蛋白的表达、纯化和复性

准备工作

1. 在 10 ml 试管中加入 4 ml LB 培养液，灭菌后加入 4 μ L 1M Amp。在 1L 的锥形瓶中加入 500 mL 的 LB，灭菌后加入 500 μ L 1M 的 Amp;
2. Co 柱的准备(来自于前次 Arg 处理后的树脂): 取 5-6 ml Co 螯合树脂，加入大约一两个柱体积的 250mM EDTA，将 Co 柱上的 Co 络合掉;用二级水冲洗几遍以除去多余的 EDTA;加入约 4 个柱体积的 Co 溶液使柱子再生(在摇床上结合 12 h 或过夜)，随后用约十几个柱体积的二级水冲洗去掉多余的 Co; 最后用约 4 个柱体积 Buffer B 平衡 Co 柱(将 Co 柱置于旋转摇床上 20~30min);

【说明】钴柱与镍柱的差异

蛋白表达、纯化与复性

3. 挑菌：从-80 $^{\circ}$ C 冰箱中取出冻存的甘油菌，不能等到其融化，立即从冻存管中挑取一小块甘油菌到装有 4mL LB 的小管;
4. 在 37 $^{\circ}$ C 摇菌大约 5 h 后，待小管内的液体浑浊($OD_{600}\approx 0.8$)
5. 扩大：将每 4ml 菌液转移到装有 500 mL LB 的锥形瓶中，在 37 $^{\circ}$ C 下摇菌扩大；(依据表达量，可能需要多个小管培养液；

【注】：建议将 4 ml 菌液转入 30-50 ml LB 中过夜培养，然后转入 500-1000 ml 培养液中，使起始 OD 约为 0.05，有利于细菌快速生长。)

6. 待菌液的 OD_{600} 约为 0.6 时，向每个 500 ml 培养液的锥形瓶中加入 200 μ L 1M 的 IPTG (终浓度为 0.4 mM) 诱导，37 $^{\circ}$ C 诱导 5~6 小时后收菌 (经过实验优化，诱导 5~6 个小时得到目标蛋白的量最大)
7. 离心收菌，4 $^{\circ}$ C、4000 rpm，20 分钟。
8. 将 1 L 菌液中得到的菌块用 30 ml Buffer A 重悬，超声破碎 (6 号变幅杆，1L 菌液大约超声 5-8 min，设置为 2's 超声+2'暂停)，
9. 离心(4 $^{\circ}$ C，16000 rpm，30 分钟)，弃上清；(上清留样跑电泳)。

10. 洗杂蛋白：用含 30 ml 2 M 尿素的 Buffer A 重悬，去除杂蛋白，（电泳已证明 2 M 尿素不会将目标蛋白从包涵体中溶解），离心 30 分钟（4℃，16000 rpm，），弃上清；（上清留样跑电泳）。
11. 用含 8M 尿素的 Buffer A 重悬（溶解包涵体中的目标蛋白），离心（16000rpm，4℃，30 分钟），留上清（上清中溶解的包含目的蛋白）。
12. 过滤膜除去杂质，否则使树脂变黑，缩短柱子使用寿命。可以先过半径 0.8 μm 的滤膜，再过 0.45 μm 的滤膜，最后过 0.22 μm 的滤膜，（这步必不可少）
13. 将溶于 8M 尿素的蛋白溶液注入 Co 柱(经 buffer B 平衡),在 4℃ 冰箱中的旋转摇床上结合 30min;
14. 梯度洗脱复性:用不含尿素的 Buffer A 梯度稀释含有 8 M 尿素的 Buffer B，在柱子上进行梯度洗脱复性，具体步骤见附图（这步最关键，一定要控制好流速，流速过快会导致蛋白不能正确折叠，就不能复性了，见后面的实验细节）

详见示意图：

柱上复性示意图： B 液槽中加入 50 ml 含有 8 M 尿素的 Buffer B，A 液槽中加入 50 ml 不含尿素的 Buffer A，B 液槽中液体经过 Buffer A 的梯度稀释，经过流速控制器流入负载蛋白的柱子。

具体操作过程：首先在 A 容器中加入 50 mL Buffer A,在 B 容器中加入 50 mL Buffer B,待液面降到约 25 mL 时，补充 Buffer A 至 50 mL，到液面降到 0 mL 时，补充至 20mL，直至液面再次降到 0 mL，补充至 20 mL。整个过程控制液体流速均匀，总时间不低于 2 小时。

15. 最后用含有 20 mM磷酸、0.5 M NaCl 、0.5M 精氨酸、0.2 M 咪唑 pH 7.0 的Buffer C将蛋白洗脱下来，将所有洗脱下来的蛋白收集测A₂₈₀吸收。

步骤三：Intein 剪接活性与抑制检测

应用实例一：cis-DDP 对 intein 自剪接的抑制作用（详见文献 3）

方法一：通过钴柱上蛋白质复性使 Intein 发生剪接

1. 接上述步骤（15），向复性后的蛋白样品（样品浓度体积调节见后面注明），加入 1~10 μ l 0.3 mM 的 cis-DDP 后，反应 12 小时；

【注意】顺铂反应时间需要一定的作用时间。如果反应时间不够，顺铂不能充分反应，蛋白会在 TCEP 的诱导下进行剪接，而从荧光中看不到顺铂的抑制作用

2. 加入 5 mM EDTA 和 2 mM TCEP（最终浓度），25°C 反应 18 h，诱导 Intein 进行自剪接，不足的体积用 Buffer C 补齐；
3. 荧光检测，GFP 的激发波长为 395 nm，在 509 nm 处有吸收峰。

方法二：用不含尿素的 Buffer 直接稀释使 GFP-intein 蛋白复性剪接

1. 将 8M 尿素溶解的 GFP-intein 蛋白溶液（或可以在 8M urea 存在的条件下用 Co 柱纯化蛋白样品，再用咪唑梯度洗脱，分管收集蛋白样品，之后电泳鉴定，目的得到更高纯度的 GFP-intein 融合蛋白）加入 cis-DDP 后，反应 12 h；
2. 加入 2 mM TCEP，25°C 反应 18 h，使 Intein 进行自剪接，不足的体积最后用 Buffer C 补齐。
3. 荧光检测，395 nm 激发，在 509 nm 处有吸收峰。。

应用实例二：通过 GFP-intein 体系检测各种金属离子对 intein 剪接活性的抑制（参考文献 2）

方法一：通过钴柱上蛋白质复性使 Intein 发生剪接

1. 向步骤 15 得到的蛋白样品中加入 5mM EDTA，用不含咪唑的 Buffer C 透析或超滤除去可以和金属离子反应的咪唑，在得到的蛋白溶液中分别加入 1 M Mn²⁺、Co²⁺、Ni²⁺、Cu²⁺、Zn²⁺和 2 mM

TCEP, 25°C 反应 18 h, 诱导Intein进行自剪接,

2. 不足的体积用不含咪唑的 Buffer C 补齐
3. 荧光检测, 结果见下图。

【注意】咪唑会和金属离子配位。用不含咪唑的 Buffer C (20 mM 磷酸, 0.5 M NaCl, 0.5 M Arginine, pH=7.0) 透析或超滤除去蛋白体系中的咪唑。

方法二: 用不含尿素的 Buffer 直接稀释使 GFP-intein 蛋白复性剪接

1. 在 8M urea 溶解的蛋白溶液中分别加入各种金属离子和 2 mM TCEP, 不足的体积用不含咪唑的 Buffer C 补齐 (20 mM 磷酸, 0.5 M NaCl, 0.5 M Arginine, pH=7.0)。同时, 由于 Buffer C 中不含尿素, 而其中的精氨酸可以增强蛋白质的溶解度帮助蛋白在溶液中折叠, 因此这个过程中融合蛋白得到复性。但如果稀释的比例太小, 蛋白体系中的尿素含量过高, 蛋白仍处于变性状态, 不能进行剪接, 因此要控制尿素的浓度, 根据文献 1, 蛋白体系中尿素的终浓度要在 1 M 以下, 以保证蛋白复性能够正常的进行后面的剪接抑制实验
2. 荧光检测。

【注】1、荧光样品对浓度灵敏度比较高, 也就是说需要的蛋白浓度不用很高。由于柱子有一定的负载量, 在保证效率的同时, 通常柱上上样量为 1 L 表达液中得到的蛋白样品的 1/3, 最后用 15 mL 的 Buffer C 洗脱, 配制荧光样品时, 洗脱样品稀释 1~4 倍, 如果峰的强

度过高过低，可以进行浓度调整，或稀释或浓缩，或调节荧光光栅的狭缝宽度，就可以得到合适的荧光强度。

可以根据荧光池的体积加入一定量的顺铂，通常用 250 μl 的池子，配制 300 μl 的样品，相比 1 ml 的荧光池，节省样品。

EDTA 的作用是络合掉蛋白从柱子上带下来的 Co 或 Ni。

参考文献

1. An in Vitro Screening System for Protein Splicing Inhibitors Based on Green Fluorescent Protein as an Indicator, Jaya Pal Gangopadhyay, Shu-qin Jiang, and Henry Paulus. *Anal. Chem.* 2003, 75, 2456-2462
2. Binding and Inhibition of Copper Ions to RecA Inteins from *Mycobacterium tuberculosis*, Liyun Zhang, Ning Xiao, Yan Pan, Yuchuan Zheng, Zhiyun Pan, Zhaofeng Luo, Xiaolong Xu and Yangzhong Liu. *Chem. Eur. J.* 2010, 16, 4297 – 4306
3. Cisplatin Inhibits Protein Splicing, Suggesting Inteins as Therapeutic Targets in *Mycobacteria*, Liyun Zhang, Yuchuan Zheng, Brian Callahan, Marlene Belfort, and Yangzhong Liu, *J. Biol. Chem.* 2011, 286, 1277–1282