

中国科学技术大学数学科学学院

2017 ~ 2018学年 第 2 学期期末考试试卷

A卷 B卷

课程名称 计算方法(B) 课程编号 001511

考试时间 2018年6月25日 考试形式 闭卷

姓名 _____ 学号 _____ 学院 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总计
得分								
评卷人								

注意事项:

- 答卷前, 考生务必将所在系、姓名、学号等填写清楚。
- 本试卷共 7 道试题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。
- 所有解答写在试卷上; 计算结果保留4位小数。

一、(30分)填空

(1) (3分) 设 $f(x) = 8x^4 - 9x + 1$, 则差商 $f[2, 4, 8, 16, 32] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(2) (3分) 含有10个积分节点的数值积分公式至多可以到 $\underline{\hspace{2cm}}$ 阶代数精度。(3) (6分) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & -7 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|A\|_\infty = \underline{\hspace{2cm}}$ (4) (6分) 两个几乎相等的数在计算机中相减, 会导致计算结果 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。设 $|x| >> 1$, 则计算 $\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}$ 时, 需要把它改写为 $\underline{\hspace{2cm}}$,(5) (6分) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 用 Jacobi 方法求它的所有特征值时, 第1步用的 Givens 旋转矩阵为 $G(p, q, \theta)$, 则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$, $q = \underline{\hspace{2cm}}$ (6) (6分) 解非线性方程 $2x = \sin(x) + \cos(x)$ 的 Newton 迭代格式为

二、(10分) 用Doolittle分解求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 = 0.5 \\ 6x_1 + 6x_3 = 6 \end{cases}$$

提示: $A = LU$, 其中 U 为上三角阵, L 为单位下三角阵, 称为 A 的Doolittle分解。

三、(12分) 按下列数据, 用最小二乘法做出 $f(x) = \frac{1}{a+bx^2}$ 形式的拟合函数。

x_i	-1	0	1	2	2.5
y_i	0.2	0.5	0.4	0.8	1.0

题

答

要

不

内

线

封

密

四、(12分) 给定线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- 1) 分别写出Jacobi迭代格式和Gauss-Seidel迭代格式;
- 2) 分析Gauss-Seidel迭代格式的收敛性

五、(12分) 构造一个3次多项式 $H(x)$, 使得

$$H(a) = 0, \quad H''(a) = b, \quad H(b) = 0, \quad H''(b) = a$$

其中 $a \neq b$ 。

题.....答.....要.....不.....内.....线.....封.....密.....

六、(12分) 给定常微分方程
$$\begin{cases} y' = f(x, y), & x \in [a, b] \\ y(a) = y_0, \end{cases}$$
 取正整数 m , 记 $h = \frac{b-a}{m}$,
 $x_n = a + nh, n = 0, 1, 2, \dots, m$ 。构造如下的线性多步格式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} [23f(x_n, y_n) - 16f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 5f(x_{n-2}, y_{n-2})]$$

1. 试导出格式的局部截断误差。
2. 试构造不低于2阶的一种可用于起步计算的格式。

七、(12分) 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, 记

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx, \quad E(a, b, f) = Af(x_0) + Bf(x_1)$$

1. 当 $a = -1, b = 1$ 时, 求参数 A, B, x_0, x_1 , 使求积公式 $E(-1, 1, f) \approx I(f)$ 的代数精度为3, 并推导出误差表达式;
2. 给出 $a < b$ 时, 具有3阶代数精度的求积公式 $E(a, b, f)$ 和它的误差表达式;
3. 取正整数 n , 记 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, 求积公式 $E(f)$ 对应的复化求积公式 $E_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} E(x_k, x_{k+1}, f)$ 。求极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(f) - E_n(f)}{h^4}$

答案

1. 8 (3分)
2. 19(3分)
3. 11 (3分), 9 (3分)
4. 的相对误差变很大 (或者, 有效位数极度减少) (3分)

$$\frac{1}{(x+1)^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{1}{3}}(x+1)^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}} \quad (3\text{分})$$

5. 3 (3分), 1 (3分) 或者 1 , 3

$$6. x_{k+1} = x_k - \frac{2x_k - \sin x_k - \cos x_k}{2 - \cos x_k + \sin x_k} \quad (6\text{分})$$

2.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1.5 & 0.5 \\ 6 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (6\text{分})$$

$$Ly = b,$$

$$Ux = y$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad (2\text{分})$$

3. 做预处理, 拟合 $\frac{1}{y} = a + bx^2$ 。 (2分)

$$\begin{pmatrix} 5 & 12.25 \\ 12.25 & 57.0625 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11.75 \\ 18.75 \end{pmatrix} \quad (6\text{分})$$

可得

$$\begin{cases} a = 3.25912662 \\ b = -0.37107209 \end{cases} \quad (2\text{分})$$

4. 1). (6分)

2). Gauss-Seidel迭代矩阵 G 的特征方程为

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2 & 1 \\ 2\lambda & 5\lambda & 3 \\ -2\lambda & -2\lambda & 3\lambda \end{vmatrix} = 0$$

(4分)

则有

$$15\lambda^3 - 12\lambda = 0$$

可得, $\rho(G) = \frac{2}{\sqrt{5}} < 1$, 即收敛。 (2分)

5. $H(a) = 0, H(b) = 0$, 则可以设

$$H(x) = (x-a)(x-b)(c_1(x-a) + c_2(b-x))$$

令 $H(x) = (x-a)f(x)$, 则

$$f(x) = (x-b)(c_1(x-a) + c_2(b-x))$$

由 $H''(x) = 2f'(x) + (x-a)f''(x)$, 及 $H''(a) = b$, 可得

$$H''(a) = 2f'(a) = b$$

$$2(c_1(b-a) + (a-b)(c_1 - c_2)) = b$$

类似, 令 $H(x) = (x-b)g(x)$, 由 $H''(x) = 2g'(x) + (x-b)g''(x)$, 及 $H''(b) = a$, 可得

$$H''(b) = 2g'(b) = a$$

$$2(c_1(b-a) + (b-a)(c_1 - c_2)) = a$$

联立, 有

$$\begin{cases} 2c_2 - c_1 = \frac{b}{2(b-a)} \\ 2c_1 - c_2 = \frac{a}{2(b-a)} \end{cases} \quad (8分)$$

可以求得

$$\begin{cases} c_1 = \frac{2a+b}{6(b-a)} \\ c_2 = \frac{a+2b}{6(b-a)} \end{cases}$$

即有

$$H(x) = (x-a)(x-b) \frac{(a-b)x - 2a^2 + 2b^2}{6(b-a)} = \frac{1}{6}(x-a)(x-b)(2(a+b)-x)$$

或者,

记 $f(x) = H''(x)$ 为一次多项式, 则有

$$f(x) = b \frac{x-b}{a-b} + a \frac{x-a}{b-a} = \frac{1}{a-b}(b(x-b) + a(a-x))$$

则

$$\begin{aligned} H(x) &= \int \left(\int f(x) dx \right) dx + c_1(x-a) + c_2(b-x) \\ &= \frac{1}{a-b} \left(b \frac{(x-b)^3}{6} + a \frac{(x-a)^3}{6} \right) + c_1(x-a) + c_2(b-x) \end{aligned}$$

由 $H(a) = 0$,

$$c_2 = \frac{b}{6}(a-b)$$

由 $H(b) = 0$,

$$c_1 = \frac{a}{6}(a-b)$$

(8分)

则

$$H(x) = \frac{1}{6} \frac{1}{a-b} (b(x-b)^3 + a(a-x)^3) + \frac{a-b}{6} (a(x-a) + b(b-x)) \quad (4分)$$

6. 1). 使用数值积分的误差, 或做Taylor展开。 (8分)

局部截断误差为以节点 x_n, x_{n-1}, x_{n-2} 为积分点, $[x_n, x_{n+1}]$ 为积分区间的数值积分公式

的误差,

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{x_n}^{x_{n+1}} (x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) \frac{y^{(4)}(\xi)}{3!} dx \\
 &= \frac{y^{(4)}(\xi)}{3!} \int_{x_n}^{x_{n+1}} (x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2}) dx \\
 &= \frac{y^{(4)}(\xi)}{3!} \int_0^1 t(t+1)(t+2)h^4 dt \\
 &= \frac{y^{(4)}(\xi)}{3!} h^4 \frac{9}{4} = \frac{3}{8} y^{(4)}(\xi) h^4
 \end{aligned}$$

使用Taylor展开。

由局部截断误差的定义及微分方程, 有

$$y_{n+1} = y(x_n) + \frac{h}{12}(23y'(x_n) - 16y'(x_{n-1}) + 5y'(x_{n-2}))$$

在点 x_n 处做Taylor展开,

$$\begin{aligned}
 y'(x_{n-1}) &= y'(x_n) + y''(x_n)(-h) + \frac{1}{2!}y'''(x_n)(-h)^2 + \frac{1}{3!}y^{(4)}(x_n)(-h)^3 + O(h^4) \\
 y'(x_{n-2}) &= y'(x_n) + y''(x_n)(-2h) + \frac{1}{2!}y'''(x_n)(-2h)^2 + \frac{1}{3!}y^{(4)}(x_n)(-2h)^3 + O(h^4)
 \end{aligned}$$

比较后, 可得

$$\begin{aligned}
 y(x_{n+1}) - y_{n+1} &= h^4 y^{(4)}(x_n) \left(\frac{1}{4!} + \frac{16}{12} \frac{1}{3!} - \frac{5}{12} \frac{1}{3!} 2^3 \right) + O(h^5) \\
 &= \frac{-5}{24} y^{(4)}(x_n) h^4 + O(h^5)
 \end{aligned}$$

在 x_{n-1} 处做Taylor展开, 有

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \frac{3}{8} y^{(4)}(x_{n-1}) h^4 + O(h^5)$$

2). 改进的Euler格式, 或梯形格式 (4分)

7. 1) 取 $f(x)$ 为1, x, x^2, x^3 列方程有

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ Ax_0 + Bx_1 = 0 \\ Ax_0^2 + Bx_1^2 = \frac{2}{3} \\ Ax_0^3 + Bx_1^3 = 0 \end{cases} \quad (2\text{分})$$

可解得

$$A = B = 1, x_0 = -x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (2分)$$

误差为

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^1 \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 dx \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_{-1}^1 (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 dx \quad (2分) \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{135} \end{aligned}$$

2) 这是Gauss求积公式

$$A = B = \frac{b-a}{2}, \quad x_0 = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2\sqrt{3}}, x_1 = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2\sqrt{3}} \quad (2分)$$

误差

$$\begin{aligned} I(f) - E(f) &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_a^b (x - x_0)^2 (x - x_1)^2 dx \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^5 \int_{-1}^1 \left(t - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(t + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 dt \quad (2分) \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{135} \left(\frac{b-a}{2}\right)^5, \xi \in (a, b) \end{aligned}$$

3)

$$I(f) - E_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{135} \left(\frac{h}{2}\right)^5 f^{(4)}(\xi_k), \xi_k \in (x_k, x_{k+1})$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(f) - E_n(f)}{h^4} &= \frac{1}{135 \times 2^5} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} h f^{(4)}(\xi_k) \\ &= \frac{1}{135 \times 2^5} \int_a^b f^{(4)}(x) dx \\ &= \frac{1}{4320} (f'''(b) - f'''(a)) \end{aligned}$$

(2分)