

## 3-1: 随机变量的数字特征

张伟平

---

## 第三章随机变量的数字特征

3.1	数学期望 (均值) 及中位数 . . . . .	2
3.1.1	数学期望 (Expectation) . . . . .	2
3.1.2	数学期望的性质 . . . . .	12
3.1.3	条件期望 (Conditional Mean) . . . . .	17
3.1.4	中位数 (Median) . . . . .	22

---

## 随机变量的性质描述

1. 随机变量的**分布函数是对随机变量的概率性质最完整的刻画**。
2. 有些时候我们更关心随机变量的某方面“特征”(完全由分布函数决定的):
  - 某行业工人的平均工资 (这里工资的分布情况不是最关心的), 或者某行业工人的工资散布程度
3. **能够刻画随机变量某些方面的性质特征的量称为随机变量的数字特征**。
  - 度量”中心”: **期望, 中位数**
  - 度量散布程度: **方差, 绝对偏差, 极差**
  - 分布形状: **偏度系数, 峰度系数**
  - 相关程度: **相关系数**

---

## 3.1 数学期望 (均值) 及中位数

### 3.1.1 数学期望 (Expectation)

数学期望也称均值 (Mean), 是随机变量的一个最基本的数字特征. 我们先看如下的一个例子

一甲乙两人赌技相同, 各出赌金 100 元, 约定先胜三局者为胜, 取得全部 200 元. 现在甲胜 2 局乙胜 1 局的情况下中止, 问赌本该如何分?

↑Example

↓Example

解: 如果继续赌下去而不中止, 则甲有  $3/4$  的概率取胜, 而乙胜的概率为  $1/4$ . 所以, 在甲胜 2 局乙胜 1 局的这个情况下, 甲能期望“得到”的数目, 应当确定为

$$200 \times \frac{3}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = 150(\text{元}),$$

---

而乙能“期望”得到的数目, 则为

$$200 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{3}{4} = 50(\text{元}).$$

如果引进一个随机变量  $X$ ,  $X$  等于在上述局面 (甲值 2 胜乙 1 胜) 之下, 继续赌下去甲的最终所得, 则  $X$  有两个可能的值: 200 和 0, 其概率分别为  $3/4$  和  $1/4$ . 而甲的期望所得, 即  $X$  的“期望”值, 即等于

$X$  的可能值与其概率之积的累加

这就是“数学期望”这个名称的由来. 另一个名称“均值”形象易懂, 也很常用.

---

↑Example

甲乙两人射击水平如下所示

甲:	击中环数	8	9	10	乙:	击中环数	8	9	10
	概率	0.3	0.1	0.6		概率	0.2	0.5	0.3

试问两人谁的水平高?

↓Example

假设两人分别射击  $N$  次, 则他们各自射击的总环数大概为

$$\text{甲: } 8 * 0.3N + 9 * 0.1N + 10 * 0.6N = 9.3N$$

$$\text{乙: } 8 * 0.2N + 9 * 0.5N + 10 * 0.3N = 9.1N$$

因此, 在  $N$  次射击后, 两人的平均击中环数分别为 9.3 和 9.1, 因此甲的水平稍高一些.

---

下面我们就给出数学期望 (均值) 的定义:

对一般的离散型分布, 我们有

设  $X$  为一离散型随机变量, 其分布律为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

如果  $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i < +\infty$ , 则称

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

Definition

为随机变量  $X$  的数学期望 (均值), 用符号  $EX$  表示. 若

$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i = +\infty$ , 则称  $X$  的数学期望 (均值) 不存在.

---

对连续型随机变量, 其数学期望的定义如下

不妨设连续型随机变量  $X$  的密度  $f(x)$  的非零取值范围为  $(a, b)$ ,  $a < b$  可以为  $\mp\infty$ , 则可以通过将  $X$  离散化来考虑  $X$  的期望:

1. 取点集  $\{x_i\}$ , 使得  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ , 区间长为  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ .
2. 定义一个新的离散型随机变量  $X'$ , 其所有可能取值点为  $\{t_i\}$ ,  $x_{i-1} < t_i \leq x_i$  且有分布律

$$P(X' = t_i) = p_i = P(x_{i-1} < X \leq x_i) \approx f(t_i)\Delta x_i$$

3. 从而有离散型随机变量期望的定义有:  $(\Delta x_i \rightarrow 0)$

$$EX' = \sum t_i p_i \approx \sum t_i f(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_R x f(x) dx := EX < \infty,$$

$$\text{如果 } \sum |x_i| p_i \approx \sum |t_i| f(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_R |x| f(x) dx < \infty.$$

---

如果连续型随机变量  $X$  的概率密度函数为  $f(x)$ , 则当

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx < \infty$$

时, 我们将积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Definition

的值称为  $X$  的数学期望, 记作  $EX$ . 如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx = \infty,$$

则称  $X$  的数学期望不存在.

---

---

下面求解几种常见分布的数学期望.

1. 二项分布  $X \sim B(n, p)$ :

2. Poisson 分布  $X \sim P(\lambda)$ :

3. 均匀分布  $X \sim U[a, b]$ :

---

4. 正态分布  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ :

5. 指数分布  $X \sim Exp(\lambda)$ :

6. 卡方分布  $X \sim \chi_n^2$ :

7.  $t$  分布  $X \sim t_n$ :

---

设  $r.v.$   $X$  的分布律为

↑Example

$$P\left(X = (-1)^k \frac{2^k}{k}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

则  $X$  的数学期望不存在。

↓Example

---

(Cauchy 分布) 设

↑Example

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathcal{R},$$

则: 该分布的期望不存在.

↓Example

---

### 3.1.2 数学期望的性质

1. 若干个随机变量线性组合的期望, 等于各变量期望的线性组合. 假设  $c_1, c_2, \dots, c_n$  为常数, 则有

$$E(c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_nX_n) = c_1EX_1 + c_2EX_2 + \dots + c_nEX_n,$$

这里假定各变量的期望都存在.

假设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 求  $EX$ .

↑Example

↓Example

---

2. 若干个独立随机变量之积的期望, 等于各变量的期望之积, 即

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = EX_1 EX_2 \cdots EX_n,$$

这里假定各变量相互独立且期望都存在.

3. (随机变量函数的期望) 设随机变量  $X$  为离散型, 有分布  $P(X = a_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$ , 或者为连续型, 有概率密度函数  $f(x)$ . 则

$$Eg(X) = \begin{cases} \sum_i g(a_i)p_i, & \sum_i |g(a_i)|p_i < \infty; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx, & \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)|f(x)dx < \infty. \end{cases}$$

---

假设  $c$  为常数, 则  $EcX = cEX$ .

↑Example

↓Example

设随机变量  $X \sim N(0, 1)$ , 求  $Y = X^2 + 1$  的数学期望.

↑Example

↓Example

---

设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 求  $Y = X(n - X)$  的数学期望.

↑Example

↓Example

---

飞机场载客汽车上有 20 位乘客, 离开机场后共有 10 个车站可以下车, 若某个车站没有人下车则该车站不停车. 设乘客在每个车站下车的可能性相等, 以  $X$  表示停车的次数, 求  $EX$ .

↑Example

↓Example

---

### 3.1.3 条件期望 (Conditional Mean)

我们知道条件分布也是一个概率分布, 因此类似数学期望的定义, 我们可以给出条件期望的定义. 在给定了随机变量  $X$  取值  $x$  的条件之下,  $Y$  的条件期望, 我们记为  $E(Y|X = x)$ , 也可简记为  $E(Y|x)$ .

设  $X$  和  $Y$  为随机变量, 若  $(X, Y)$  为离散型, 且在给定  $X = x$  之下,  $Y$  有分布  $P(Y = a_i|X = x) = p_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , 或者  $(X, Y)$  为连续型, 且在给定  $X = x$  之下,  $Y$  的条件密度函数为  $f(y|x)$ . 则

Definition

$$E(Y|X = x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x)dy, & (X, Y) \text{ 为连续型;} \\ \sum_i a_i p_i, & (X, Y) \text{ 为离散型.} \end{cases}$$

---

期望所具有的性质条件期望同样满足.

设  $(X, Y) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 试计算  $E(Y|X = x)$ .

↑Example

↓Example

[注]: 条件期望  $E(Y|X = x)$  是  $x$  的函数, 当我们将  $x$  换为  $X$  时,  $E(Y|X)$  就是一个随机变量.

我们有如下的公式成立:

---

**定理 1** (Law of total expectation). 设  $X, Y$  为两个随机变量. 则有

$$EX = E\{E[X|Y]\} \quad [\text{全期望公式}]$$

---

一窃贼被关在有 3 个门的地牢里, 其中第一个门通向自由. 出这门走 3 个小时便可以回到地面; 第 2 个门通向另一个地道, 走 5 个小时将返回到地牢; 第 3 个门通向更长的地道, 走 7 个小时也回到地牢. 若窃贼每次选择 3 个门的可能性总相同, 求他为获得自由而奔走的平均时间.

↑Example

↓Example

---

设  $(X, Y) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 试计算  $EXY$ .

↑Example

↓Example

---

### 3.1.4 中位数 (Median)

我们已经知道, 随机变量  $X$  的数学期望就是它的平均值, 因此从一定意义上, 数学期望刻画了随机变量所取之值的“中心位置”. 但是, 我们也可以用别的数字特征来刻画随机变量的“中心位置”. 中位数就是这样一种数字特征.

称  $m$  为连续型随机变量  $X$  的中位数, 如果

$$P(X \leq m) \geq \frac{1}{2}, \quad P(X \geq m) \geq \frac{1}{2}.$$

Definition

从定义上可以看出,  $m$  这个点把  $X$  的分布从概率上一分两半: 在

---

$m$  左边占一半,  $m$  右边也占一半, 从概率上说,  $m$  这个点正好居于中央, 这就是“中位数”得名的由来.

- 中位数总是存在的.
- 和期望值相比中位数的一个优点是它受个别特别大或特别小的值的影响很小, 而期望则不然: 收入差距非常大时, 中位数比均值更加有效

虽则中位数有这些优点, 但在概率统计中, 无论理论和应用上, 数学期望的重要性都超过中位数, 其原因有一下两个方面:

1. 均值有很多优良的性质, 这些性质时使得在数学处理上很方便. 例如,  $E(X_1 + X_2) = EX_1 + EX_2$ , 而  $X_1 + X_2$  的中位数与  $X_1$ ,  $X_2$  各自的中位数之间, 不存在简单的联系, 这使中位数在数学上的处理很复杂且不方便;
2. 中位数本身固有的某些缺点: 中位数可以不唯一, 且对于离散型随机变量不易定义.

---

设随机变量  $X \sim B(1, \frac{1}{2})$ , 求  $X$  的中位数.

↑Example

↓Example

中位数的定义是  $p$  分位数定义的特例:

设  $0 < p < 1$ , 称  $\mu_p$  是随机变量  $X$  的  $p$  分位数, 如果

$$P(X \leq \mu_p) \geq p, \quad P(X \geq \mu_p) \geq 1 - p.$$

Definition